


RESPONDER-HF-onderzoek

Kaart met tips voor het identificeren van patiënten



Atriale-shunttherapie voor patiënten met hartfalen met EF $\geq 40\%$

BELANGRIJKSTE CRITERIA VOOR PATIËNTEN

- Leeftijd ≥ 40 jaar
- Hartfalen van NYHA-klasse II, III of ambulante IV met:
 - ≥ 1 ziekenhuisopname vanwege hartfalen, behandeling met intraveneuze of $\uparrow$ orale diuretica (in de voorafgaande 12 mnd); OF
 - Normale of matig verhoogde BNP/NT-proBNP (in de voorafgaande 6 mnd)
- Lopende, stabiele, volgens GDMT uitgevoerde behandeling van hartfalen en behandeling van comorbiditeiten
- Echocardiografisch bewijs van diastolische disfunctie
- BMI $< 45 \text{ kg/m}^2$

GEEN huidige/eerdere situatie met de volgende:

- Geïmplanteerde pacemaker of ICD, of CRT-therapie
- Hemodynamisch significante klepaandoening ($\geq 3+$ MR, $>$ lichte MS, graad $\geq 2+$ TR, $\geq 2+$ AR, $>$ matige AS)
- Beroerte, TIA, DVT of PE (in de voorafgaande 6 mnd)
- RV-disfunctie $>$ licht of TAPSE $< 1,4 \text{ cm}$
- Krijgt momenteel dialyse of eGFR $< 25 \text{ ml/min/1,73 m}^2$

NB: Een invasieve hemodynamische evaluatie is nodig om geschiktheid voor het onderzoek te bepalen.

Neem voor meer informatie contact op met:

VEELVOORKOMENDE TEKENEN DAT INSPANNINGSDYSPNEU WORDT VEROORZAAKT DOOR HFpEF



PCWP, LVEDP of LAP
tijdens rust > 15 mmHg



Opmerkingen in dossier:
'kortademigheid', 'hartfalen',
'vochtoverbelasting', 'diurese', 'oedeem'



Vergroting van LA
Septum buigt over naar RA
Hypertrofie van LV



H₂FPEF-score van **3+**
(zie hieronder)

SCOREMODEL VOOR H₂FPEF¹

Tel punten op om HFpEF te identificeren bij
patiënten met inspanningsdyspneu.

Klinische variabele	Waarden	Punten
H Heavy	Overgewicht: body mass index > 30 kg/m ²	+2
H₂ Hypertensive	Hoge bloeddruk: gebruikt > 2 bloeddrukverlagende middelen	+1
F Atrial F ibrillation	Atriumfibrillatie: paroxysmale of persisterende AF	+3
P Pulmonary Hypertension	Pulmonale hypertensie: RVSP > 35 mmHg	+1
E Elder	Oudere persoon: leeftijd > 60 jaar	+1
F Filling Pressure	Vulddruk: E/e' > 9	+1

Een score van	3	4	5	6+
duidt op een kans op HFpEF van	> 50%	> 70%	> 80%	> 90%



Corvia Medical, Inc.
One Highwood Drive, Suite 300
Tewksbury, MA 01876, VS

1. Reddy YNV, et al. *Circulation*. 2018;138(9):861–870.

Onderzoek gesponsord door Corvia Medical. clinicaltrials.gov
identificatienr. NCT05425459
IASD en Corvia zijn gedeponeerde handelsmerken van
Corvia Medical, Inc.

©2022 Corvia Medical, Inc.
Alle rechten voorbehouden. PS00734, 00731AW (NL)
rev. 00 10-2022